**Инструкция**
**по применению препарата**
**Интра Аэрозоль (Intra Aerosol)**

(Производитель: Intracare B.V. Voltaweg 45466 AZ Veghel)

**Москва, 2016 г.**

# Инструкция
# по применению препарата Интра Аэрозоль
# (Intra Aerosol)

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Препарат Интра Аэрозоль (Intra Aerosol) представляет собой жидкость, светло-желтого цвета, плотностью 0,95 ± 0,01 г./мл, хорошо растворимую в воде. Содержит в качестве действующих веществ натуральные ингредиенты: масло мяты перечной 32 ± 3 г/л, ментол 91 ± 9 г/л, эвкалиптовое масло 121 ± 12 г/л, эмульгаторы и другие вспомогательные компоненты.

1.2. Препарат Интра Аэрозоль (Intra Aerosol) расфасован в полимерные канистры емкостью 1 л, 5 л и 10 л.

1.3. Срок годности препарата Интра Аэрозоль (Intra Aerosol) при соблюдении условий хранения составляет 2 года с даты изготовления.

1.4. Препарат Интра Аэрозоль (Intra Aerosol) разработан, и производится в соответствии с требованиями к безопасности продуктов питания и кормов, имеет сертификаты GMP (Нидерланды) и QMS (Германия).

1.5. Препарат Интра Аэрозоль (Intra Aerosol) обладает антибактериальными свойствами против патогенных микроорганизмов, и используется как безопасное и эффективное средство во всех отраслях сельскохозяйственного производства (птицеводство, свиноводство, животноводство) предназначенное для профилактики поствакцинальных реакций, теплового стресса и респираторных заболеваний. Не является антибиотиком.

## 2. ПОКАЗАНИЯ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ИНТРА АЭРОЗОЛЬ (INTRA AEROSOL)

**2**.1. Интра Аэрозоль применяется:

- для снижения негативных поствакцинальных реакций
- для лечения и профилактики заболеваний бронхов и верхних дыхательных путей;
- для устранения слизи в верхних дыхательных путях;
- для облегчения состояния птиц и животных при температурном стрессе;
- в пред забойный период, когда введение антибиотиков уже не допускается (4-5 дней до убоя);
- в качестве альтернативы антибиотикам.

2.2. Способы применения:

2.2.1. Перорально:

- с целью предотвращения поствакцинальных реакций (вакцинации (НБ – болезнь Ньюкасла или ИБ – инфекционный бронхит) на следующий день, в течение 4-х – 5-и дней;
- при угрозе и увеличении вспышек заболеваний дыхательных путей, в течение 3-х дней;
- для стимулирования потребления корма и воды;

2.2.2. Аэрозольно:

- для предотвращения стресса при высокой плотности поголовья и в жаркий период.

3.3. Интра Аэрозоль (Intra Aerosol) не следует использовать в питьевой воде совместно с антибиотиками или другими препаратами.

## 3. ДОЗИРОВКА

3.1. Для перорального использования Интра Аэрозоль (Intra Aerosol) применяется в концентрации рабочего раствора 0,02% (200 мл/1000 л)

Например:

При суточной потребности в питьевой воде 1000 л установить расход дозирующего устройства (медикатора) на 1% и использовать приготовленный маточный раствор в концентрации 200 мл препарата на 10 л теплой воды (примерно 40 С°).

3.2. Для аэрозольного распыления посредством генератора холодного тумана применяется 2% (200 мл/10 л) концентрация рабочего раствора Интра Аэрозоль (Intra Aerosol).

| Метод применения | Вид животных | Концентрация рабочего раствора | Назначение |
|---|---|---|---|
| **Перорально:** | | | |
| - для профилактики респираторных заболеваний | Птица, свиньи | 200 мл Интра Аэрозоль на 1000 л питьевой воды | в течение 24 часов, от 3 до 4 дней |
| | Молодняк КРС | 1 мл Интра Аэрозоль на 4 л молока. | 2-хразовая выпойка в день, один раз в неделю |
| - при высоком уровне респираторных заболеваний | Молодняк КРС | 1 мл Интра Аэрозоль на 4 л молока. | в течение 3 – 7 дней при каждой выпойке молока |
| - для снижения реакции на вакцинацию | Птица, свиньи | 200 мл Интра Аэрозоль на 1000 л питьевой воды | через 2 дня после вакцинации ИБ, НБ в течение 3 дней, дважды в день. |
| **Аэрозольная (спрей) обработка генератором холодного тумана:** | | | |
| - для профилактики стресса;<br>- при высокой плотности поголовья;<br>- в жаркий период;<br>- при высоком уровне запыленности помещения. | Птица, свиньи, КРС | 200 мл Интра Аэрозоль на 10 л воды | 2-4 обработки в день, или в случае необходимости |

3.3. Меры предосторожности:

Следует избегать одновременного использования Интра Аэрозоль (Intra Aerosol) с живыми вакцинами, антибиотиками и др. препаратами. Не применять за два дня до и после вакцинации.

## 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во время использования препарата запрещается есть, пить и курить.

4.2. Избегать контакта препарата с кожей, его попадания в глаза и на одежду.

4.3. Не допускать попадания в препарат различных видов тяжелых металлов и легковоспламеняющихся веществ.

4.4. Не вливать пролитую жидкость обратно в канистру с препаратом.

4.5. Не смешивать с другими препаратами.

4.5. В целях безопасности используйте средства индивидуальной защиты

## 5. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

5.1. При работе с Интра Аэрозоль (Intra Aerosol) следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с препаратами.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Препарат Интра Аэрозоль (Intra Aerosol) перевозят любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспортного средства.

6.2. Хранить препарат на складе в упаковке предприятия-производителя. Температура хранения от + 5°С до + 25°С.

6.3. Хранить препарат отдельно от легковоспламеняющихся веществ, нестойких агентов и щелочей.

6.4. Хранить в недоступном для детей, затемненном месте.

6.5. Срок хранения средства, при соблюдении условий, в закрытой таре составляет 24 месяца со дня изготовления.

«Утверждаю»:

| | |
|---|---|
| ООО «Рамонь Агро»<br>Генеральный директор<br>Минько С. В. | Intracare B.V.<br>Sale manager<br>J. van Geest |

« 10 » января 2016 г.